

Használati útmutató

Hypo koncentrátum Felület- és uszodavíz fertőtlenítő szer

Felhasználás: a Hypo koncentrátum a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet V. számú melléklete szerinti 1. Főcsoport 2. terméktípusba tartozó fertőtlenítő és algásodás elleni szer.

Hypo koncentrátum: gyorsan oldódó klórtermék granulátum/tabletta formában.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, algicid.

Adagolás/alkalmazási koncentrációk uszodai vízkezelés esetén:

Feltöltéskor 1m³ vízhez 3 g Hypo koncentrátum granulátum terméket kell adni. Folyamatos üzemben 10 m³ vízhez 40 g Hypo koncentrátum granulátum vagy 2 darab 20 grammos Hypo koncentrátum tablettát kell adni hetente. Nagyobb medencék esetében 20 m³ vízhez 1 darab 200 grammos Hypo koncentrátum tablettát kell adagolni 1-2 hetente. A víz aktív klór tartalma 0,4 - 0,8 mg/l legyen. Megemelkedett hőmérséklet, nagyobb terhelés esetén az adagolt mennyiséget növelni kell. A Hypo koncentrátum adagolását lehetőleg naplemente után végezzük. Ügyeljünk a víz pH értékére, legjobb a 7,4 pH érték. Adagolása szkimmeren, úszó vegyszeradagolón vagy vízforgató rendszerbe épített vegyszeradagolón keresztül történhet.

Behatási/várakozási idő: A kezelt vízben a teljes elkeveredésig (min. 30 perc) fürdőző nem tartózkodhat, illetve amíg a szabad klór koncentrációja 1 mg/l felett van.

Felhasználás során az alábbi feltételek betartása szükséges:

- A Terméket a használati útmutató szerint kell alkalmazni.
- A Termék maradék hatóanyagait a fürdővízben megfelelő teszt módszerrel rendszeresen ellenőrizni szükséges.
- A klóros fertőtlenítők használatakor a medencében fürdőző nem tartózkodhat, amíg a fürdővízben a szabad klór mennyisége 1 mg/l érték felett van.
- Izocianursav-származékok használatakor-különösen a kültéri medencék esetében-a medencevíz izocianursav koncentrációját rendszeresen ellenőrizni szükséges, mert ennek növekedésével a fertőtlenítőszer hatékonysága nagymértékben csökkenhet. A maximálisan megengedhető koncentráció 100 mg/l.
- A granulátum illetve tablettá kiserelésű Termékek legfeljebb 70 m³ medence térfogatig használhatók, illetve nagyobb medencék esetén oldatként, adagoló pumpa segítségével alkalmazhatók.
- A granulátum és tablettá típusú Termékek közvetlenül a medencébe történő adagolását követően a teljes elkeveredésig a vízben fürdőző nem tartózkodhat.
- A Termék abban az esetben alkalmazható közösségi fürdővizekben is, ha a fürdővízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.
- Amennyiben a Terméket olyan fürdő esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élővízbe kerül, felhasználás előtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

Adagolás/alkalmazási koncentrációk felületfertőtlenítés esetén:

Klóráló felületek fertőtlenítésére készítsünk 5%-os vizes oldatot (40⁰). A behatási idő min. 5 perc. A fertőtlenítő oldatot mindig frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni. A fertőtlenítő oldattal töröljük át a fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.

Alkalmazási terület: különböző felületek, anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítése köz- és egészségügyi intézményekben, vendéglátóipari területen élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületeken és egyéb ipari területeken.

Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

A termékre vonatkozó előírások:**Elsősegélynyújtás:**

A mérgezési tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek, ezért orvosi megfigyelés szükséges a balesetet követő legalább 48 órán keresztül.

Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegőre. Szükség esetén hívjon orvost.

Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Bőrrel érintkezve: az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a bőrfelületet bő vízzel le kell mosni. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelve: a sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel, és óvatosan itassunk vele vizet. Azonnal gondoskodjunk orvosi ellátásról.

Védőfelszerelés:

Porálarc, védőkesztyű, szorosan záró védőszemüveg. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.

Csomagolás:

A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható.

A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt gyűjteni, veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tárolás:

Szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, hőtől, közvetlen napfénytől védve, gyújtóforrástól távol, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve, savaktól, távol tárolandó.

Környezetvédelem:

Nem szabad élővízbe, csatornába engedni.

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.